

Math-Net.Ru

Общероссийский математический портал


О. А. Горкуша, Совместное распределение примитивных целых точек в замкнутой области, *Чебышевский сб.*, 2015, том 16, выпуск 1, 163–175

Использование Общероссийского математического портала Math-Net.Ru подразумевает, что вы прочитали и согласны с пользовательским соглашением
<http://www.mathnet.ru/rus/agreement>

Параметры загрузки:

IP: 62.76.193.42

28 апреля 2015 г., 08:59:28



ЧЕБЫШЕВСКИЙ СБОРНИК
Том 16 Выпуск 1 (2015)

УДК 511.9, 511.336

СОВМЕСТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРИМИТИВНЫХ ЦЕЛЫХ ТОЧЕК
В ЗАМКНУТОЙ ОБЛАСТИ ¹

О. А. Горкуша (г. Хабаровск)

Аннотация

Пусть $\Omega \subset \mathbf{R}^2$ — произвольная выпуклая область. Точка $(0, 0)$ лежит внутри области или на границе. Граница $\partial\Omega$ области задана в полярных координатах функцией $r_\Omega(\theta)$ из C^3 . Для произвольного $R \geq 1$ определим область $\Omega_R = \{(Rx, Ry) | (x, y) \in \Omega\}$ и множество

$$\mathcal{F}(\Omega, R) = \{A \in \Omega_R \cap \mathbf{Z}^2 | A = (x, y), \text{НОД}(x, y) = 1\}$$

— множество примитивных точек решетки \mathbf{Z}^2 , лежащих в Ω_R . В работе мы изучаем совместное распределение длин отрезков, соединяющих начало координат и точки из $\mathcal{F}(\Omega, R)$. Мы получили асимптотическую формулу

$$\frac{\#\Phi(R)}{\#\mathcal{F}(\Omega, R)} = 2 \int_0^\beta \int_0^\alpha [\alpha' + \beta' \geq 1] d\alpha' d\beta' + O(R^{-\frac{1}{3}} \log^{\frac{2}{3}} R),$$

где $[A] = 1$, если A — истинно, и $[A] = 0$, если A — ложно и для $\alpha, \beta \in [0, 1]$ величина $\#\Phi(R)$ равна числу фундаментальных параллелограммов решетки \mathbf{Z}^2 , у которых длины d_1, d_2 сторон не превосходят $\alpha \cdot R \cdot r_\Omega(\theta_1)$, $\beta \cdot R \cdot r_\Omega(\theta_2)$.

Ключевые слова: примитивные точки решетки, совместное распределение.

Библиография: 4 названия.

SIMULTANEOUS DISTRIBUTION
OF PRIMITIVE LATTICE POINTS
IN CONVEX PLANAR DOMAIN

O. A. Gorkusha (Khabarovsk)

¹Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, (грант 14-01-90002 Бел-а).

Abstract

Let Ω denote a compact convex subset of R^2 which contains the origin as an inner point. Suppose that Ω is bounded by the curve $\partial\Omega$, parametrized by $x = r_\Omega(\theta) \cos \theta$, $y = r_\Omega(\theta) \sin \theta$, where r_Ω is continuous and piecewise C^3 on $[0, \pi/4]$. For each real $R \geq 1$ we consider the domain $\Omega_R = \{(Rx, Ry) | (x, y) \in \Omega\}$ and we consider $\mathcal{F}(\Omega, R) = \{A \in \Omega_R \cap \mathbf{Z}^2 | A = (x, y), \text{НОД}(x, y) = 1\}$ — integer lattice points from Q_R , which are visible from the origin. In this paper we study the simultaneous distribution for the lengths of the segments connecting the origin and a primitive lattice points from $\mathcal{F}(\Omega, R)$. Actually, we give an asymptotic formula

$$\frac{\#\Phi(R)}{\#\mathcal{F}(\Omega, R)} = 2 \int_0^\beta \int_0^\alpha [\alpha' + \beta' \geq 1] d\alpha' d\beta' + O(R^{-\frac{1}{3}} \log^{\frac{2}{3}} R),$$

where $[A] = 1$, if A is true, $[A] = 0$, if A is false and for $\alpha, \beta \in [0, 1]$ the value $\#\Phi(R)$ is equal to the number of fundamental parallelograms of the lattice \mathbf{Z}^2 for which the lengths d_1, d_2 of the segments do not exceed $\alpha \cdot R \cdot r_\Omega(\theta_1)$, $\beta \cdot R \cdot r_\Omega(\theta_2)$.

Keywords: primitive lattice points, simultaneous distribution.

Bibliography: 4 titles.

1. Введение

Пусть на плоскости задана область Ω в полярных координатах

$$\Omega = \{(r, \varphi) | 0 \leq r \leq r(\varphi), 0 \leq \varphi \leq \varphi_0 \leq \pi/4\} \quad (1)$$

с непрерывной границей. Для любого вещественного числа $R \geq 1$ рассмотрим

$$\Omega_R = \{(Rx, Ry) | (x, y) \in \Omega\}$$

— гомотетию области Ω в R раз. Обозначим через $\mathcal{F}(\Omega, R)$ — множество примитивных целых точек из Ω_R и упорядочим элементы из этого множества таким образом, чтобы последовательность $\{\theta_j\}$ углов $\theta_j = \arctg(y_j/x_j)$, где (x_j, y_j) — элемент из $\mathcal{F}(\Omega, R)$, была возрастающей. Таким образом

$$\mathcal{F}(\Omega, R) = \left\{ A_j \in \Omega_R \cap \mathbf{Z}^2 \left| \begin{array}{l} A_j = (x_j, y_j), \text{НОД}(x_j, y_j) = 1, \\ \theta_j < \theta_{j+1}, 1 \leq j < N \end{array} \right. \right\}, \quad (2)$$

где N — число элементов множества $\mathcal{F}(\Omega, R)$. Точки A_j, A_{j+1} называются соседними, и лучи с началом в точке $(0, 0)$, проходящие через точки A_j, A_{j+1} также называют соседними.

В работе [1], опубликованной в 2000 году, решена задача о распределении элементов

$$\frac{N}{2\pi}(\theta_2 - \theta_1), \dots, \frac{N}{2\pi}(\theta_N - \theta_{N-1}). \quad (3)$$

Авторы доказали, что существует предельное распределение указанных элементов и получили явное представление этой величины. В 2009 году в статье [2, с. 176] автор заметил, что вопрос о распределении элементов (3) легко решается, если известно совместное распределение длин отрезков d_j, d_{j+1} ($1 \leq j < N$), где $d_j = \sqrt{x_j^2 + y_j^2}$. Основной результат работы [2] — исследование совместного распределения d_j, d_{j+1} ($1 \leq j < N$) в случае треугольной области:

ТЕОРЕМА 1. Пусть Ω — треугольник, задаваемый равенством (1) с $r(\varphi) = \frac{1}{\cos(\varphi)}$. Тогда при любых вещественных числах $\alpha, \beta \in [0, 1]$, $\varphi_0 \in [0, \pi/4]$, $R \geq 2$ справедлива асимптотическая формула

$$\frac{\#\Phi(R)}{N_{\varphi_0}(R)} = \mathcal{I}(\alpha, \beta) + O(R^{-\frac{1}{2}} \log^3 R).$$

Здесь

$$\begin{aligned} \Phi(R) &= \Phi(R; \varphi_0, \alpha, \beta) = \\ &= \left\{ (A_j, A_{j+1}) \in \mathcal{F}^2(\Omega, R) \left| \begin{array}{l} A_j = (x_j, y_j), 0 < j < \#\mathcal{F}(\Omega, R) \\ d_j \leq \alpha R r(\theta_j), d_{j+1} \leq \beta R r(\theta_{j+1}), \\ \theta_{j+1} \leq \varphi_0 \end{array} \right. \right\}, \end{aligned} \quad (4)$$

$$N_{\varphi_0}(R) = \sum_{j=0}^{N-1} [\theta_{j+1} \leq \varphi_0], \quad (5)$$

$$\mathcal{I}(\alpha, \beta) = 2 \int_0^\beta \int_0^\alpha [\alpha' + \beta' \geq 1] d\alpha' d\beta'. \quad (6)$$

Здесь и далее для некоторого утверждения $A : [A] = 1$, если A истинно, и $[A] = 0$ в противном случае.

Цель нашей работы — на основе подхода, предложенного в статье [2], доказать асимптотическую формулу о совместном распределении длин отрезков d_j, d_{j+1} ($1 \leq j < N$) для области Ω , обладающей более слабыми ограничениями.

Пусть область Ω задается соотношением (1), функция $r(\varphi)$ — трижды дифференцируема на $[0, \varphi_0]$ и на этом интервале соответствующие ей функции

$$x(\varphi) = r(\varphi) \cos \varphi, \quad y(\varphi) = r(\varphi) \sin \varphi$$

монотонны с условиями $x'(\varphi) \leq 0, y'(\varphi) \geq 0, |x'(\varphi)|, y'(\varphi) < \infty$, и функция $\Psi(\varphi)$, определяемая как

$$\Psi(\varphi) = x''(\varphi) - 2x'(\varphi) \tan \varphi, \quad (7)$$

такова, что $\Psi(\varphi), \Psi'(\varphi)$ одновременно не обращаются в нуль на $[0, \varphi_0]$. Тогда справедлив следующий аналог теоремы 1.

ТЕОРЕМА 2. При указанных выше ограничениях на область Ω справедлива асимптотическая формула

$$\frac{\#\Phi(R)}{N_{\varphi_0}(R)} = \mathcal{I}(\alpha, \beta) + O(R^{-\frac{1}{3}} \log^{\frac{2}{3}} R),$$

где $\alpha, \beta \in [0, 1]$, $\varphi_0 \in [0, \pi/4]$, $R \geq 2$ — произвольные вещественные числа и величины $\Phi(R)$, $N_{\varphi_0}(R)$, $\mathcal{I}(\alpha, \beta)$ определены соотношениями (4) — (6).

ЗАМЕЧАНИЕ 1. В частном случае, когда функция $\Psi(\varphi)$ не обращается в нуль на интервале $[0, \varphi_0]$, теорема 2 дает лучшую оценку остаточного члена — $O(R^{-\frac{1}{2}+\varepsilon})$.

Не упоминая каждый раз, будем считать дальше, что граница области Ω удовлетворяет условиям теоремы 2.

2. Нахождение $\#\Phi(R)$

Прежде рассмотрим другое описание множества $\Phi(R)$.

УТВЕРЖДЕНИЕ 2. Для любых соседних точек $A_j = (x_j, y_j)$ и $A_{j+1} = (x_{j+1}, y_{j+1})$ из $\mathcal{F}(\Omega, R)$ точка $(x_j + x_{j+1}, y_j + y_{j+1})$ не лежит в области Ω_R .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Доказательство непосредственно следует из определения соседних точек из множества $\mathcal{F}(\Omega, R)$. \square

УТВЕРЖДЕНИЕ 3. Если $\alpha + \beta < 1$, то $\#\Phi(R) = 0$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $\alpha + \beta < 1$ и $\#\Phi(R) > 0$. Тогда для некоторых вещественных чисел $\alpha' \in (0, \alpha)$ и $\beta' \in (0, \beta)$ найдется пара точек $A_j = (x_j, y_j)$, $A_{j+1} = (x_{j+1}, y_{j+1})$ из $\mathcal{F}(\Omega, R)$ с условиями

$$\begin{aligned} x_j &= \alpha' R r(\theta_j) \cos \theta_j, & x_{j+1} &= \beta' R r(\theta_{j+1}) \cos \theta_{j+1}, \\ y_j &= \alpha' R r(\theta_j) \sin \theta_j, & y_{j+1} &= \beta' R r(\theta_{j+1}) \sin \theta_{j+1}. \end{aligned}$$

Положим $\theta = \operatorname{arctg} \frac{y_j + y_{j+1}}{x_j + x_{j+1}}$. Из утверждения 1 следует неравенство

$$r(\theta) \leq \alpha r(\theta_j) + \beta r(\theta_{j+1}),$$

при этом $r(\theta) > \max\{r(\theta_j), r(\theta_{j+1})\}$. Эти ограничения выполняются только в случае $\alpha + \beta \geq 1$, что противоречит условию утверждения. \square

Определим множества $\mathcal{T}_+(R)$, $\mathcal{T}_-(R)$, $\mathcal{T}(R)$, состоящие из четверок неотрицательных чисел, следующим образом:

$$\mathcal{T}_+(R) = \left\{ (P, P', Q, Q') \left| \begin{array}{l} P'Q - PQ' = 1, Q \leq Q', P' \leq Q' \tan \varphi_0, \\ (Q, P) \in \Omega_{\alpha R}, (Q', P') \in \Omega_{\beta R}, \\ (Q + Q', P + P') \notin \Omega_R \end{array} \right. \right\}, \quad (8)$$

$$\mathcal{T}_-(R) = \left\{ (P, P', Q, Q') \left| \begin{array}{l} P'Q - PQ' = -1, Q \leq Q', P \leq Q \tan \varphi_0, \\ (Q, P) \in \Omega_{\beta R}, (Q', P') \in \Omega_{\alpha R}, \\ (Q + Q', P + P') \notin \Omega_R \end{array} \right. \right\}, \quad (9)$$

$$\mathcal{T}(R) = \mathcal{T}_-(R) \cup \mathcal{T}_+(R). \quad (10)$$

ЛЕММА 1. $\#\Phi(R) = \#\mathcal{T}(R)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Сразу заметим, что из определений (8), (9) следует, что множества $\mathcal{T}_-(R)$, $\mathcal{T}_+(R)$ не пересекаются.

Пусть $A_j = (x_j, y_j)$, $A_{j+1} = (x_{j+1}, y_{j+1})$ — соседние точки из множества $\mathcal{F}(\Omega, R)$ с $(A_j, A_{j+1}) \in \Phi(R)$. Положим

$$(P, P', Q, Q') = \begin{cases} (y_j, y_{j+1}, x_j, x_{j+1}), & \text{если } x_j \leq x_{j+1}, \\ (y_{j+1}, y_j, x_{j+1}, x_j), & \text{если } x_j > x_{j+1}. \end{cases}$$

Из (1), (2), (4) и утверждения 1 следует, что $(P, P', Q, Q') \in \mathcal{T}(R)$, следовательно, $\#\Phi(R) \leq \#\mathcal{T}(R)$. С другой стороны, положив

$$(y_j, y_{j+1}, x_j, x_{j+1}) = \begin{cases} (P, P', Q, Q'), & \text{если } (P, P', Q, Q') \in \mathcal{T}_+(R), \\ (P', P, Q', Q), & \text{если } (P, P', Q, Q') \in \mathcal{T}_-(R), \end{cases}$$

получаем, что $A_j = (x_j, y_j)$, $A_{j+1} = (x_{j+1}, y_{j+1})$ — соседние точки из $\mathcal{F}(\Omega, R)$ и пара (A_j, A_{j+1}) принадлежит $\Phi(R)$. Поэтому $\#\Phi(R) \geq \#\mathcal{T}(R)$. Лемма 1 доказана. \square

Вычислим $\#\mathcal{T}_+(R)$. Предварительно сделаем замену переменных $q = Q'$, $u = P'$, $v = Q$ и следуя определению (8) множества $\mathcal{T}_+(R)$, получаем

$$\#\mathcal{T}_+(R) = \sum_{q < R} \sum_{u, v=1}^q \delta_q(uv - 1), \quad (11)$$

где

$$\delta_q(uv - 1) = \begin{cases} 1, & \text{если } uv \equiv 1 \pmod{q}, \\ 0, & \text{в противном случае.} \end{cases}$$

— характеристическая функция делимости на q и

$$u \leq q \tan(\varphi_0), (q, u) \in \Omega_{\beta R}, (vq, uv - 1) \in \Omega_{\alpha q R}, (q(q + v), u(q + v) - 1) \notin \Omega_{qR}.$$

Так как область $\{(u, v) | (vq, uv - 1) \in \Omega_{\alpha q R}, (q(q + v), u(q + v) - 1) \notin \Omega_{q R}\}$ ограничена линиями

$$\{(u, f_1(u))\} = \{(u, v) | v = \alpha R x(t), u = q \tan(t) + \frac{1}{\alpha R x(t)}, t \in [0, \varphi_0]\},$$

$$\{(u, f_2(u))\} = \{(u, v) | v = R x(t) - q, u = q \tan(t) + \frac{1}{R x(t)}, t \in [0, \varphi_0]\},$$

то (11) переписывается следующим образом:

$$\#\mathcal{T}_+(R) = \sum_{q < R} \sum_{(q, u) \in \Omega_{\beta R}} \sum_{f_2(u) < v \leq \min\{q, f_1(u)\}} \delta_q(uv - 1).$$

А если вместо функций $f_1(u), f_2(u)$ использовать функции $g_1(u, \alpha), g_2(u)$, определяемые как

$$\{(u, g_1(u, \alpha))\} = \{(u, v) | v = \alpha R x(t), u = q \tan(t), t \in [0, \varphi_0]\}, \quad (12)$$

$$\{(u, g_2(u))\} = \{(u, v) | v = R x(t) - q, u = q \tan(t), t \in [0, \varphi_0]\}, \quad (13)$$

то ошибка, получившаяся от этой замены, не превзойдет единицы. Поэтому

$$\begin{aligned} \#\mathcal{T}_+(R) &= S(R, \alpha, \beta) + O(1), \\ S(R, \alpha, \beta) &= \sum_{q < R} \sum_{u \in I(q, \beta)} \sum_{g_2(u) < v \leq \min\{q, g_1(u, \alpha)\}} \delta_q(uv - 1), \\ I(q, \beta) &= \{u \in (0, q] | (q, u) \in \Omega_{\beta R}\}. \end{aligned} \quad (14)$$

Для нахождения этой суммы нам потребуется оценка числа решений сравнения $uv \equiv 1 \pmod{q}$ в области $\{(u, v) | u \in (X_1, X_2], v \in (0, f(u))\}$.

ЛЕММА 2. Пусть X_1, X_2, Y — вещественные неотрицательные числа, не превосходящие q . Тогда

$$\sum_{u \in (X_1, X_2]} \sum_{v \in (0, Y]} \delta_q(uv \pm 1) = \frac{Y}{q} \sum_{\substack{u \in (X_1, X_2] \\ \text{НОД}(q, u) = 1}} 1 + O(R_1[q]),$$

где

$$R_1[q] \ll \sigma(q) \log^2(q + 1) \sqrt{q},$$

$\sigma(q) = \sum_{d|q} 1$ — сумма делителей числа q .

ЛЕММА 3. Пусть на отрезке $[X_1, X_2]$ ($0 \leq X_1, X_2 \leq q$) вещественная неотрицательная функция $f(x)$ имеет две производные и для некоторых $A > 0, w \geq 1$

$$\frac{1}{A} \ll |f''(x)| \ll \frac{w}{A}.$$

Тогда

$$\sum_{u \in (X_1, X_2]} \sum_{0 < v \leq f(u)} \delta_q(uv \pm 1) = \frac{1}{q} \sum_{\substack{u \in (X_1, X_2] \\ \text{НОД}(q, u) = 1}} f(u) + O(R_2[q, A, X_2 - X_1]),$$

где

$$R_2[q, A, X] \ll_w \sigma^{\frac{2}{3}}(q) X A^{-\frac{1}{3}} + X^\epsilon (\sqrt{A} + \sqrt{q}).$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Доказательство леммы 2 и леммы 3 см. в [3]. \square

Теперь обратимся к (14). Запишем $S(R, \alpha, \beta)$ в виде

$$S(R, \alpha, \beta) = S'_1(R, \alpha, \beta) + S''_1(R, \alpha, \beta) - S_2(R, \alpha, \beta), \tag{15}$$

где

$$\begin{aligned} S'_1(R, \alpha, \beta) &= \sum_{q \leq R} \sum_{u \in I'(q, \alpha, \beta)} \sum_{v \in (0, q]} \delta_q(uv - 1), \\ S''_1(R, \alpha, \beta) &= \sum_{q \leq R} \sum_{u \in I''(q, \alpha, \beta)} \sum_{v \in (0, g_1(u, \alpha)]} \delta_q(uv - 1), \\ S_2(R, \alpha, \beta) &= \sum_{q \leq R} \sum_{u \in I'(q, \alpha, \beta) \cup I''(q, \alpha, \beta)} \sum_{v \in (0, g_2(u)]} \delta_q(uv - 1). \end{aligned}$$

Здесь отрезки $I'(q, \alpha, \beta), I''(q, \alpha, \beta)$ определяются так:

$$\begin{aligned} I'(q, \alpha, \beta) &= \{u \in I(q, \beta) | g_2(u) < q \leq g_1(u, \alpha)\}, \\ I''(q, \alpha, \beta) &= \{u \in I(q, \beta) | g_2(u) < g_1(u, \alpha) \leq q\}. \end{aligned}$$

Используя лемму 2 и оценку $\sum_{q < R} \sigma(q) \ll R \log R$, вычислим

$$S'_1(R, \alpha, \beta) = \sum_{q < R} \frac{1}{q} \sum_{\substack{u \in I'(q, \alpha, \beta) \\ \text{НОД}(q, u) = 1}} q + O(R^{\frac{3}{2}} \log^3 R). \tag{16}$$

Относительно исследования двух других сумм $S''_1(R, \alpha, \beta)$ и $S_2(R, \alpha, \beta)$ мы должны принять во внимание то, что для фиксированного натурального числа q вторые производные функций $g_1(u, \alpha)$ и $g_2(u)$ могут обращаться в нуль в интервалах суммирования $I''(q, \alpha, \beta)$ и $I'(q, \alpha, \beta) \cup I''(q, \alpha, \beta)$.

ЛЕММА 4. Для сумм $S''_1(R, \alpha, \beta)$ и $S_2(R, \alpha, \beta)$ справедливы асимптотические формулы

$$\begin{aligned} S''_1(R, \alpha, \beta) &= \sum_{q < R} \frac{1}{q} \sum_{\substack{u \in I''(q, \alpha, \beta) \\ \text{НОД}(q, u) = 1}} g_1(u, \alpha) + O(R^{2-\frac{1}{3}} \log^{\frac{2}{3}} R), \\ S_2(R, \alpha, \beta) &= \sum_{q < R} \frac{1}{q} \sum_{\substack{u \in I'(q, \alpha, \beta) \cup I''(q, \alpha, \beta) \\ \text{НОД}(q, u) = 1}} g_2(u, \alpha) + O(R^{2-\frac{1}{3}} \log^{\frac{2}{3}} R). \end{aligned}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Мы докажем утверждение для $S_1''(R, \alpha, \beta)$, поскольку для $S_2(R, \alpha, \beta)$ доказательство проводится так же.

Из (12) следует, что

$$g_1''(u, \alpha) = \frac{\alpha R}{q^2} \cos^4(t) \Psi(t), \quad t = \arctg\left(\frac{u}{q}\right),$$

где функция $\Psi(t)$ определена соотношением (7). $\Psi(t)$ может обращаться в нуль только в конечном числе точек. Для простоты будем считать, что равенство $\Psi(t) = 0$ выполняется только в одной точке — обозначим эту точку через t_0 , а соответствующее значение переменной u через u_0 .

Если $t_0 \notin (0, \varphi_0]$, то к внутренним двум суммам по переменным u и v величины $S_1''(R, \alpha, \beta)$ можно применить лемму 3 с $A = \frac{q^2}{R}$. Следовательно,

$$S_1''(R, \alpha, \beta) = \sum_{q < R} \frac{1}{q} \sum_{\substack{u \in I''(q, \alpha, \beta) \\ \text{НОД}(q, u) = 1}} g_1(u, \alpha) + O(R^{\frac{3}{2} + \varepsilon}), \quad (17)$$

так как

$$\sum_{q < R} R_2 \left[q, \frac{q^2}{R}, q \right] \ll R^{\frac{3}{2} + \varepsilon}.$$

Для этого случая лемма доказана.

Пусть теперь $t_0 \in (0, \varphi_0]$. Положим

$$u_{max} = \max_{u \in I''(q, \alpha, \beta)} \{u\}, \quad k = [\log_2 u_{max}],$$

$$S(q, J) = \sum_{\substack{u \in J \\ u \in I''(q, \alpha, \beta)}} \sum_{v \in (0, g_1(u, \alpha)]} \delta_q(uv - 1),$$

где J — интервал изменения переменной u .

Разделим интервал $(0, u_{max}]$ на интервал

$$J^{(0)} = (u_0 - \Delta q, u_0 + \Delta q] \cap I''(q, \alpha, \beta),$$

который может быть пустым и на интервалы J_i ($1 \leq i \leq k + 1$) вида

$$J_i = \begin{cases} (2^{i-1}, 2^i] \cap I''(q, \alpha, \beta), & \text{если } J^{(0)} = \emptyset, \\ (2^{i-1}, 2^i] \cap I''(q, \alpha, \beta) \setminus (J^{(0)} \cap (2^{i-1}, 2^i]), & \text{в противном случае,} \end{cases}$$

часть из которых также могут быть пустыми. При этом $0 < \Delta < 1$ — пока любое вещественное число, не зависящее от q . С учетом этого представим сумму $S_1''(R, \alpha, \beta)$ в виде

$$S_1''(R, \alpha, \beta) = \sum_{q < R} \sum_{1 \leq i \leq k+1} S(q, J_i) + \sum_{q < R} S(q, J^{(0)}).$$

Из множества интервалов $\{J_i\}_{i=1}^{k+1}$ выделим интервалы, которые граничат с $J^{(0)}$, таковые обозначим через $J^{(1)}, J^{(2)}$. К $S(q, J^{(0)})$ применим лемму 2, заменив функцию $g_1(u, \alpha)$ на отрезке суммирования по переменной u константой, равной $g_1(u_0 - \Delta q, \alpha)$, и учтем ошибку, полученную при такой замене, не превосходящую $R\Delta^2$. К остальным суммам применим лемму 3, полагая

$$A = \frac{q^2}{R} \begin{cases} \Delta^{-1} & \text{— для } J^{(1)}, J^{(2)}, \\ q \cdot 2^{-i} & \text{— для } J_i, \text{ не совпадающего с } J^{(1)}, J^{(2)}. \end{cases}$$

В результате мы получим

$$S_1''(R, \alpha, \beta) = \sum_{q < R} \frac{1}{q} \sum_{\substack{u \in I''(q, \alpha, \beta) \\ \text{НОД}(q, u) = 1}} g_1(u, \alpha) + O(R''),$$

где

$$R'' = R_1'' + R_2'', \quad (18)$$

$$R_1'' \ll \sum_{q < R} R_1[q] + \sum_{q < R} R\Delta^2, \quad (19)$$

$$R_2'' \ll \sum_{q < R} \sum_{i < \log q} R_2 \left[q, \frac{q^3}{R \cdot 2^i}, 2^i \right] + \sum_{q < R} R_2 \left[q, \frac{q^2}{R\Delta}, \Delta \right]. \quad (20)$$

Первое слагаемое в правой части (19) равно $O(R^{\frac{3}{2}} \log^3 R)$, а второе — $O(R^2 \Delta^2)$. Оценим R_2'' . Используя лемму 3, представим правую часть (20) как сумму трех слагаемых $\Sigma_1, \Sigma_2, \Sigma_3$:

$$\begin{aligned} \Sigma_1 &= \sum_{q < R} \sum_{i < \log q} \sigma^{\frac{2}{3}}(q) 2^i \left(\frac{R \cdot 2^i}{q^3} \right)^{\frac{1}{3}} + \sum_{q < R} \sigma^{\frac{2}{3}}(q) \Delta \left(\frac{R\Delta}{q^2} \right)^{\frac{1}{3}}, \\ \Sigma_2 &= \sum_{q < R} \sum_{i < \log q} 2^{\varepsilon i} \sqrt{\frac{q^3}{R \cdot 2^i}} + \sum_{q < R} \Delta^\varepsilon \sqrt{\frac{q^2}{R\Delta}}, \\ \Sigma_3 &= \sum_{q < R} \sum_{i < \log q} 2^{\varepsilon i} \sqrt{q} + \sum_{q < R} \Delta^\varepsilon \sqrt{q}, \end{aligned}$$

и последовательно вычислим каждое из них.

Сумму Σ_1 можно упростить на основании того, что второе слагаемое в ней меньше первого, поэтому

$$\begin{aligned} \Sigma_1 &\ll R^{\frac{1}{3}} \sum_{q < R} \sigma^{\frac{2}{3}}(q) q^{-1} \sum_{i < \log q} 2^{\frac{4}{3}i} \ll R^{\frac{1}{3}} \sum_{q < R} \sigma^{\frac{2}{3}}(q) q^{\frac{1}{3}} \ll \\ &\ll R^{\frac{1}{3}} \left(\sum_{q < R} \sigma(q) \right)^{\frac{2}{3}} \left(\sum_{q < R} q \right)^{\frac{1}{3}} \ll R^{1 + \frac{2}{3}} \log^{\frac{2}{3}} R. \end{aligned}$$

По этой же причине в сумме Σ_2 достаточно рассмотреть только первое слагаемое, при этом суммировать по тем индексам q и i , для которых $\frac{q^3}{R \cdot 2^i} \geq 1$. Поскольку на всех полуинтервалах J_i с $1 \leq i \leq k+1$ имеет место ограничение $g''(u) \gg \frac{R \cdot \Delta}{q^2}$, то $\frac{R \cdot 2^i}{q^3} \gg \frac{R \cdot \Delta}{q^2}$. Отсюда

$$\begin{aligned} \Sigma_2 &\ll \sum_{q < R} \sum_{i < \log q} 2^{\varepsilon i} \sqrt{\frac{q^3}{R \cdot 2^i}} \ll \sum_{q < R} \sum_{i < \log q} 2^{\varepsilon i} \sqrt{\frac{q^2}{R \cdot \Delta}} \ll \\ &\ll R^{-\frac{1}{2}} \Delta^{-\frac{1}{2}} \sum_{q < R} q^{1+\varepsilon} \ll R^{\frac{3}{2}+\varepsilon} \Delta^{-\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

Так как $\Sigma_3 \ll R^{\frac{3}{2}+\varepsilon}$, то мы заключаем, что $R_2'' \ll R^{1+\frac{2}{3}} \log^{\frac{2}{3}} R + R^{\frac{3}{2}+\varepsilon} \Delta^{-\frac{1}{2}}$, и возвращаясь к (18), получаем оценку остаточного члена для $S_1''(R, \alpha, \beta)$:

$$R'' \ll R^{\frac{3}{2}} \log^3 R + R^2 \Delta^2 + R^{1+\frac{2}{3}} \log^{\frac{2}{3}} R + R^{\frac{3}{2}+\varepsilon} \Delta^{-\frac{1}{2}}.$$

Выберем теперь Δ так, чтобы $R^2 \Delta^2 \asymp R^{\frac{3}{2}+\varepsilon} \Delta^{-\frac{1}{2}}$, то есть $\Delta = R^{-\frac{1-2\varepsilon}{5}}$. Тогда $R'' \ll R^{1+\frac{2}{3}} \log^{\frac{2}{3}} R$, из чего следует утверждение леммы. \square

Обозначим $F(u, q, \alpha) = \min\{q, g_1(u, \alpha)\} - g_2(u)$. Согласно (15), (16) и лемме 4, сумма $S(R, \alpha, \beta)$ имеет вид

$$S(R, \alpha, \beta) = \sum_{q < R} \frac{1}{q} \sum_{\substack{u \in I(q, \beta) \\ \text{НОД}(q, u) = 1}} F(u, q, \alpha) + O(R^{2-\frac{1}{3}} \log^{\frac{2}{3}} R). \quad (21)$$

Из (12), (13) следует равенство

$$\frac{1}{q} \sum_{\substack{u \in I(q, \beta) \\ \text{НОД}(q, u) = 1}} F(u, q, \alpha) = \frac{1}{q} \sum_{\delta | q} \mu(\delta) \sum_{\substack{u \in I(q, \beta) \\ \delta | u}} F(u, q, \alpha),$$

где $\mu(\delta)$ — функция Мёбиуса. А так как

$$\sum_{\substack{u \in I(q, \beta) \\ \delta | u}} F(u, q, \alpha) = \frac{1}{\delta} \int_0^q [u \in I(q, \beta)] F(u, q, \alpha) du + O(q),$$

и согласно определений (12), (13)

$$\begin{aligned} &\int_0^q [u \in I(q, \beta)] F(u, q, \alpha) du = \\ &= q^2 \int_0^1 \int_0^1 \left[t \leq \min\{t_q, \varphi_0\}, v \in \left(\frac{R}{q} x(t) - 1, \alpha \frac{R}{q} x(t) \right) \right] dv d \tan(t), \end{aligned}$$

где величина t_q задается соотношением $q = \beta R x(t_q)$, то главный член в (21), который мы обозначим через $S^*(R, \alpha, \beta)$ можно написать в виде

$$S^*(R, \alpha, \beta) = \sum_{\delta < R} \mu(\delta) S' \left(\frac{R}{\delta} \right), \quad (22)$$

где

$$S'(R) = \sum_{q < R} q \int_0^1 \int_0^1 \left[t \leq t_q, t \leq \varphi_0, \frac{R}{q}x(t) - 1 < v \leq \alpha \frac{R}{q}x(t) \right] dv d \tan(t).$$

Здесь мы учли, что остаток $\sum_{q < R} \frac{1}{q} \sum_{\delta|q} q \ll R \log R$ меньше остаточного члена в (21).

При вычислении $S'(R)$ изменим порядок суммирования и интегрирования, затем полученную внутреннюю сумму заменим интегралом. От такой замены возникает ошибка самое большее R . В итоге находим

$$\begin{aligned} S'(R) &= \\ &= R^2 \frac{1}{2} \int_0^{\varphi_0} x^2(t) d \tan(t) \int_0^1 \left[\frac{1}{\beta} - 1 < v < \frac{\alpha}{1-\alpha} \right] \left(\min \left\{ \frac{\alpha^2}{v^2}, \beta^2 \right\} - \frac{1}{(v+1)^2} \right) dv + \\ &\quad + O(R). \end{aligned}$$

Интегрируя с учетом утверждения 2, получаем $S'(R) = R^2 S_\Omega \cdot I(\alpha, \beta) + O(R)$, где

$$I(\alpha, \beta) = [\alpha + \beta \geq 1] \cdot [\beta \geq 1/2] \cdot \begin{cases} (\alpha + \beta - 1)^2, & \text{если } \alpha \leq 1/2, \\ 2(\beta - 1/2)^2 - (\alpha - \beta)^2, & \text{если } 1/2 < \alpha \leq \beta, \\ 2(\beta - 1/2)^2, & \text{если } \alpha > \beta, \end{cases}$$

и S_Ω — площадь области Ω . Отсюда и из (14), (21), (22) следует асимптотическая формула для $\#\mathcal{T}_+(R)$:

$$\#\mathcal{T}_+(R) = \frac{R^2}{\zeta(2)} S_\Omega \cdot I(\alpha, \beta) + O(R^{2-\frac{1}{3}} \log^{\frac{2}{3}} R),$$

где $\zeta(s)$ — дзета-функция Римана.

Для нахождения асимптотической формулы для $\#\mathcal{T}_-(R)$, применим соотношение, подобное (11). В результате получим

$$\#\mathcal{T}_-(R) = \sum_{q < R} \sum_{u,v=1}^q \delta_q(uv + 1),$$

при этом

$$u \leq q \tan(\varphi_0) - 1/v, (q, u) \in \Omega_{\alpha R}, (vq, uv - 1) \in \Omega_{\beta q R}, (q(q+v), u(q+v) - 1) \notin \Omega_{qR}.$$

Согласно (12)—(14) $T_-(R) = S(R, \beta, \alpha) + O(R)$, из чего следует, что

$$\#\mathcal{T}_-(R) = \frac{R^2}{\zeta(2)} S_\Omega \cdot I(\beta, \alpha) + O(R^{2-\frac{1}{3}} \log^{\frac{2}{3}} R).$$

И последнее, замечая равенство $I(\alpha, \beta) + I(\beta, \alpha) = \mathcal{I}(\alpha, \beta)$ и учитывая лемму 1, получаем соотношение для $\#\Phi(R)$:

$$\#\Phi(R) = \frac{R^2}{\zeta(2)} S_\Omega \cdot \mathcal{I}(\alpha, \beta) + O(R^{2-\frac{1}{3}} \log^{\frac{2}{3}} R). \tag{23}$$

3. Доказательство теоремы 2

Теорема следует из (23) и из асимптотической формулы для $\#\mathcal{F}(\Omega, R)$:

$$\begin{aligned} \#\mathcal{F}(\Omega, R) &= \sum_{\substack{(x,y) \in F(\Omega, R) \\ \text{НОД}(x,y)=1}} 1 = \sum_{(x,y) \in F(\Omega, R)} \sum_{\delta | \text{НОД}(x,y)} \mu(\delta) = \\ &= \sum_{\delta < R} \mu(\delta) \sum_{(x,y) \in F(\Omega, R/\delta)} 1 = \\ &= R^2 \cdot S_{\Omega} \sum_{\delta < R} \frac{\mu(\delta)}{\delta^2} + O(R \log(R)) = \frac{R^2}{\zeta(2)} \cdot S_{\Omega} + O(R \log(R)). \end{aligned}$$

4. Заключение

В основе результата работы лежат асимптотические свойства решений уравнения $PQ' - P'Q = 1$. Наличие оценок на суммы Клостермана (см. обзор [4]) позволяет находить асимптотические формулы для сумм вида (11). Важным продолжением этой работы может послужить нахождение асимптотических формул для среднего числа подходящих дробей различных классов непрерывных дробей, связанных с областью Ω .

СПИСОК ЦИТИРОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Boca F. P., Cobeli C., Zaharescu A. Distribution of lattice points visible from the origin // *Comm. Math. Phys.* 2000. Vol. 20. P. 433–470.
2. А. В. Устинов О распределении точек целочисленной решетки // *Дальневосточный математический журнал.* 2009. Т. 9, № 1–2. С. 176–181.
3. А. В. Устинов О числе решений сравнения $xy \equiv l \pmod{q}$ под графиком дважды непрерывно дифференцируемой функции // *Алгебра и анализ.* 2008. Т. 20, № 5. С. 186–216.
4. D Heath-Brown. Arithmetic applications of Klosterman sums. *Nieuw Arch. Wiskd.*, 5/1, 2000, 380–384

REFERENCES

1. Boca, F. P., Cobeli, C. & Zaharescu, A. 2000, "Distribution of lattice points visible from the origin.", *Comm. Math. Phys.*, Vol. 20, p. 433–470.
2. Ustinov, A., 2009, "On the distribution of integer points.", *Far Eastern Mathematical Journal.* Vol. 9, № 1–2, *Khabarovsk*, p. 176–181.

3. Ustinov, A., 2009, "On the number of solutions of the congruence $xy = l \pmod{q}$.", *St. Petersburg Mathematical Journal*. Vol. 20, no. 5, *St. Petersburg*, p. 813–836.
4. D Heath-Brown. Arithmetic applications of Kloosterman sums. *Nieuw Arch. Wiskd.*, 5/1,2000, 380–384

Хабаровское отделение ИПМ ДВО РАН
Поступило 25.02.2015